

فهرست مطالب

- ۱ * فاشیاتومی، نارسائی وریدی مزمن و نقش پمپ عضلانی ساق پا
- بررسی اثر بازکردن فاشیا در حرکت خون در ساق که تحت تأثیر پمپ عضلانی می‌باشد.
- ۸ * رسیدگی به انسداد روده‌های ناشی از اسکاریازیس
- اثر داروهای فلج‌کننده کرم‌های روده (اسکاریس) در ایجاد انسداد روده به صورت ناقص یا کامل در یک کارآزمایی بالینی مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن در بیمارانی که دچار علائم شکمی هم بوده‌اند بازنگری شده است.
- ۱۱ * سرطان مری و کاردیا: آیا سن تأثیری در نحوه انتخاب درمان و بازده جراحی دارد؟
- بعضی پزشکان بر این عقیده‌اند که در آن دسته از بیماران مبتلا به سرطان مری و کاردیا که سن بالایی دارند به علت مرگ و میر زیاد و میزان بقای کم بایستی از جراحی بزرگ خودداری کرد. در این مقاله تجربه نگارندگان مورد بررسی قرار گرفته که آیا سن در نوع درمان دخالت دارد یا خیر.
- ۱۹ * اثرات فیزیولوژیکی هورمونهای استروئیدی و درمان هورمونی جایگزین در دوره بعد از یائسگی بر روی پستان و خطر ابتلا به سرطان در زنان (قسمت اول)
- مشخص است که هورمون‌های استروئیدی در ایجاد و رشد پستان همچنین در ترمورزایی پستان مؤثرند. این اثر برای تعداد زیادی از پزشکان که بیماریهای پستان را معالجه می‌کنند واضح نیست و این که استفاده از این هورمونها بعد از زمان یائسگی باعث ایجاد سرطان پستان می‌شود یا خیر برایشان مبهم است. در این بررسی جامع موضوع به‌طور مشخص مورد توجه قرار گرفته و نفع و زیان آن بیان شده است.
- ۲۹ * نقش سونوگرافی دوپلکس در تعیین روش جراحی بیماران با ایسکمی تهدیدکننده اندام
- قدرت تشخیص و پیش‌آگهی color-flow-duplex اولتراسوند در ضایعات عروق محیطی و مقایسه نتایج به‌دست آمده با آنژیوگرافی، اسکن شریانی و نتایج زمان عمل مورد بررسی قرار گرفته است.
- ۳۸ * آپاندیسیت پرفوره در کودکان؛ عوامل خطرزا در راستای وقوع عوارض
- در بررسی و درمان سوراخ‌شدگی آپاندیس متورم در کودکان عقیده مشترکی وجود ندارد. در این بررسی کوشش شده است عواملی که در ایجاد عوارض بعد از عمل دخالت دارند مشخص گردد.

۲۵ * مروری بر پیشگیری از زخم معده ناشی از استرس در بخشهای مراقبت ویژه مغز و اعصاب

استرس اولسر در بیمارانی که در ICU به علت ضایعات مغزی بستری هستند به طور متداول دیده می شود. معمولاً بعد از ۲۴ ساعت از ضایعه ایجاد می شود و ممکن است باعث خونریزی شدید که همراه با مرگ و میر در حدود ۵۰ درصد می باشد گردد. بیماری زایی کاملاً مشخص نیست. در این مقاله علت ایجادی مورد بررسی قرار گرفته و درمان بحث شده است.

۵۶ * ارزیابی توده های پستانی در زنان جوانتر از ۴۰ سال

توده های پستانی در خانم های جوان نسبتاً فراوان هستند اما سرطان پستان کمیاب است. در این بررسی ارتباط ناراحتی های بیمار و وجود یک توده پستانی و اثر تشخیصی FNA، سونوگرافی و ماموگرافی در توده هایی که خیلی هم بیمار را ناراحت نکرده اند مورد توجه قرار گرفته است.

۶۳ * زمانبندی تثبیت شکستگی ناشی از ترومای غیر نافذ در بیماران با جراحات شدید سر

درمان سریع شکستگیها در بیمارانی که دچار ضایعات مغزی هستند مورد توجه زیادی قرار گرفته زیرا معتقد هستند از عوارض بعدی می کاهد چون اجازه می دهد بیمار زودتر حرکت کند و در نتیجه مدیاتورهای التهابی کمتر ترشح شود. این عقیده مورد استقبال همگانی قرار نگرفته و در این بررسی سعی شده است با توجه به نتایج بالینی این موضع روشن گردد.

۷۱ * توسعه و عواقب زخم های پای دیابتی

نوروپاتی و ایسکمی از عوارض شناخته شده دیابت هستند که شاید در یک سوم موارد زمینه لازم را برای ایجاد زخم های پا در بیماران دیابتی ایجاد می کنند. البته وجود عامل فیزیکی و مکانیکی با توجه به این زمینه مساعد ضروری است. مکانیسم ایجاد کننده زخم در زخم های ایسکمیک و زخم های نوروپاتی کاملاً متفاوت است و وجود زمینه دیابتی باعث افزایش خطر عفونت در این زخم ها می شود. در این مقاله طرز تشکیل زخم های دیابتی با بررسی مقالات علمی مورد توجه قرار گرفته است.

۸۳ * فتق کشاله ران و روش درست جراحی

از ۱۸۸۹ که باسینی و هالستد برای اولیه بار گزارش موفقیت آمیز ترمیم فتق را از طریق دوختن انساج اطراف کانال مغبنی گزارش کردند تاکنون همه جراحان از شکلی از این نوع ترمیم استفاده کرده اند. به تازگی جراحی آندوسکوپی گذاشتن مش بدون استفاده از دوخت و دوز را در درمان این نوع ناراحتی مطرح کرده است. در این بررسی اندیکاسیون استفاده از مش و اینکه کدام یک از دو روش بالا موفقیت آمیزتر می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

۸۹ * درمان جراحی رفع فشار از عصب اولنار در ناحیه آرنج: تحلیلی بر مطالعات انتشار یافته

درمان جراحی فشار به عصب اولنار شامل برداشتن اپیکوندیل، آزادسازی عصب، تغییر مکان عصب در زیر جلد، داخل عضله و زیر عضله می باشد. نویسندگان مقاله انواع درمان ها را در مقالات علمی مورد بررسی قرار داده اند.

۹۷ * آیا ارزیابی پاتولوژیک کیسه های فتق در اطفال به صورت روتین صحیح است؟

هرنیورافی جزء اعمال شایع در اطفال می باشد. بررسی ساک فتق از نظر امکان قطع یا بستن مجرای دفران مورد بررسی قرار گرفته است.

• تحت فشار قرار گرفتن سیستم عروقی در محل خروج از قفسه سینه ۱۰۱

در ۵ دهه اخیر پیشرفت‌های زیادی در زمینه تشخیص و درمان TOS به‌خصوص بعد از فعالیت‌های ورزشی، کاشت‌های پستانی و استرنومی میانی به عمل آمده است. در این گزارش ۱۵۰۰۰ بیمار که تحت درمان و بررسی قرار گرفته‌اند مطرح و نتایج با توجه به نوع درمان جراحی، علائم بیماری، علل بی‌نتیجه بودن بعضی از روش‌ها، روش‌های درمانی، ضایعات عروقی ایجادکننده سندروم و درمانهای طبی به‌کار رفته تجزیه و تحلیل شده است.

• نقش لنفادنکتومی در درمان سرطان تمایز یافته تیروئید ۱۰۹

سرطان پاپیلاری تیروئید شایع‌ترین فرم سرطان تیروئید می‌باشد. معمولاً دارای پیش‌آگهی خوبی است و برای اینکه بتوان در مورد نوع جراحی بحث کرد بایستی سالیان دراز بیماران را بررسی کرد در هر حال برداشتن کامل یا نزدیک به کامل تیروئید درمان انتخابی است. مسئله‌ای که فعلاً مورد نظر است مسئله گره‌های لنفاوی گردن است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

• درمان لنفوم اولیه معده و لنفوم نسج لنفوئیدی مخاط معده ۱۱۱

لنفوم اولیه معده یک بدخیمی نادر است که طبق گزارشات ۲ تا ۷ درصد بدخیمی‌های اولیه معده را تشکیل می‌دهد. لنفوم اولیه معده ممکن است به غدد لنفاوی انتشار یابد و معمولاً از B cell شروع می‌شود. البته T cell و نوع هوچکین هم گزارش شده است. در این مطالعه درمان لنفوم اولیه مورد بررسی قرار گرفته است.

• افزایش فشار داخل شکمی و سندروم کمپارتمان شکمی ۱۲۰

ابعاد مختلف ازدیاد فشار داخل شکم بحث شده و علل، علائم و طرز درمان مورد بررسی قرار گرفته است.

• اووئیت ناشی از دارو ۱۲۳

اووئیت در اثر استفاده از داروهای موضعی داخل چشمی و اطراف چشمی و استفاده از دارو به‌شکل سیستمیک گزارش شده است. نارانجو و همکاران در سال ۱۹۸۱ هفت عامل را در ایجاد این ناراحتی بیان کردند. در اینجا بررسی داروهایی که می‌توانند این ناراحتی را به‌وجود بیاورند مطالعه و معرفی شده‌اند.

• راهکارها و استراتژی رسیدگی به کلدوکولیتیاژیس ۱۲۰

ورود لاپاروسکوپ به جراحی برای درمان سنگهای مجاری صفرا و کیسه صفرا نوع درمان را در این نوع بیماران بیشتر مطرح ساخته است. در این مقاله اینکه نوع درمان بایستی با توجه به وضعیت بیمار تصمیم‌گیری شود مورد بحث قرار گرفته است.

• التهاب حاد اپیدیدیم در کودکان: عامل خفته؟ ۱۵۰

توصیه برای ختنه کردن در سالهای اخیر تغییرات بسیاری پیدا کرده است. در گزارشات متعدد صحبت از افزایش عفونت‌های مجاری ادراری در کسانی است که ختنه نشده‌اند. در این مقاله ارتباط بین التهاب اپیدیدیم و ختنه مورد بررسی قرار گرفته است.

• نشانه‌های سرطان سر و گردن در مراحل اولیه: یک شاخص ناکافی ۱۵۵

اهمیت تشخیص زودرس سرطانهای سر و گردن مشخص نشده است. معمولاً علائم بالینی فوق‌العاده دیررس هستند. در این بررسی عوامل مستعدکننده از قبیل تنباکو و الکل مورد بررسی و اهمیت بررسی عمومی برای تشخیص این نوع ضایعه مورد توجه قرار گرفته است.

نوروفتالمولوژی یک رشته بسیار مشکل برای چشم پزشکان و متخصصان اعصاب می باشد. متأسفانه علائم و نشانه های این بیماران معمولاً به صورت غیر آشکار است و به آسانی از چشم پنهان می ماند. اگرچه این دسته بیماران در زمینه کار روزانه چشم پزشکان کمیاب هستند ولی عدم توجه به این نشانه ها می تواند اثرات ناگواری برای بیماران داشته باشد در این مقاله انتشارات گذشته در مورد تظاهرات چشمی بیمارانی که دارای ضایعات عصبی هستند مورد بررسی قرار گرفته است.